

# Asaphida

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az **Asaphida** a háromkaréjú ősrákok (*Trilobita*) osztályához és a *Librostoma* alosztályához tartozó rend.

## Tartalomjegyzék

**Tudnivalók**

**Rendszerezés**

**Források**

Fordítás

## Tudnivalók



*Asaphus kowalewski*



*Asaphus expansus robustus*

Az Asaphida-rend a középső kambriumtól a szilurig élte virágkorát. A háromkaréjú ősrákok osztályának egyik legnagyobb rendjét alkotja. Az eddigi felfedezett trilobita fajok 20 százaléka, ehhez az alrendhez tartozik.

Az Asaphida-fajok feje és farka igen hasonlóak. A legtöbb faj hasi részének közepén feltűnő összeforrás látható. A fejlegtöbbször lapos, és alig különíthető el a test többi részétől. A tornak általában 5 - 12 szelvénye van, de vannak olyan fajok is, amelyeknek csak 2 vagy

akár 30 szelvénye is van. Egyes faj fejét széles kiemelkedés veszi körül, ami hóéke megjelenést ad az állatnak. Általában nagy szemeik vannak.

### Asaphida



Evolúciós időszak: Középső kambrium - késő szilur



*Asaphus lepidurus*

### Rendszertani besorolás

Ország: Állatok (*Animalia*)

Törzs: Ízeltlábúak (*Arthropoda*)

Osztály: Háromkaréjú ősrákok (*Trilobita*)

Alosztály: *Librostoma*

Rend: **Asaphida**  
Fortey & Chatterton, 1988

### Hivatkozások



A Wikifajok tartalmaz **Asaphida** témájú rendszertani információt.



A Wikimédia Commons tartalmaz **Asaphida** témájú kategóriát.

Az Asaphoidea öregcsaládban megfigyelhető a szem evolúciója. Például, amíg az Asaphus kowalewskiinak apró szemei voltak, amelyek, mint a mai csigáknál nyúlványokon ültek, addig a fejlettebb Asaphus lepidurusnak és az Asaphus expansusnak fejközeli nagy szemeik voltak. Az Asaphus kowalewskii a középső ordovícium korszakban élt, a mai Kelet-Európa területén, amely akkoriban egy sekély tenger volt. Feltételezik, hogy ez az állat a tengerfenéken, a homokba rejtőzve ült, és csak a nyúlványokon levő szemek látszottak ki.

A legtöbb Asaphida-faj az ordovícium-szilur kihalási esemény következtében elpusztult, csak a Trinucleioidea öregcsalád élte túl a kihalási eseményt, de a szilur vége felé ők is kihaltak.

## Rendszerezés

---

A rendbe az alábbi öregcsaládok tartoznak:

- Anomocaroidae
- Asaphoidea
- Cyclopygoidea
- Dikelocephaloidea
- Remopleuridioidea
- Trinucleoidea

- Inertae sedis (az alábbi családok rendszertani helyzete bizonytalan):
  - Monkaspididae
  - Rhyssometopidae

## Források

---

- Wikifajok
- N. Lawrow (1856). *Verhandlungen der Kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg Jahr 1855–1856*.
- Some of the information in this article was taken from the website A Guide to the Orders of Trilobites (<http://www.trilobites.info/>) by Sam Gon III.
- Ivantsov A.U., Paleontological Journal, Vol. 37, Suppl 3, 2003.

## Fordítás

Ez a szócikk részben vagy egészben az Asaphida című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

---

A lap eredeti címe: „<https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Asaphida&oldid=20135601>”

---

**A lap utolsó módosítása: 2018. július 13., 17:52**

A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.